

**Rappel important :**

**Sens de variation d'une fonction :**

On oublie souvent de préciser **strictement**, mais il ne faut pas oublier qu'une fonction strictement croissante est croissante. Ce n'est donc pas faux.



Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  est :

- **croissante** sur  $I$ , lorsque pour tous réels  $a$  et  $b$  de  $I$ , tels que  $a < b$ , on a  $f(a) \leq f(b)$ .

- **strictement croissante** sur  $I$ , lorsque pour tous réels  $a$  et  $b$  de  $I$ , tels que  $a < b$ , on a  $f(a) < f(b)$ . **Le sens de l'inégalité est conservé**

- **décroissante** sur  $I$ , lorsque pour tous réels  $a$  et  $b$  de  $I$ , tels que  $a < b$ , on a  $f(a) \geq f(b)$ .

- **strictement décroissante** sur  $I$ , lorsque pour tous réels  $a$  et  $b$  de  $I$ , tels que  $a < b$ , on a  $f(a) > f(b)$ . **Le sens de l'inégalité change**



**Du sens de variation au signe de la dérivée :**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Si  $f$  est croissante sur  $I$ , alors pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$ .
- Si  $f$  est décroissante sur  $I$ , alors pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$ .
- Si  $f$  est constante sur  $I$ , alors pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) = 0$

**Du signe de la dérivée au sens de variation :**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Si pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$ , alors  $f$  est croissante sur  $I$ .
- Si pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$ , alors  $f$  est décroissante sur  $I$ .
- Si pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) = 0$ , alors  $f$  est constante sur  $I$ .

**Fonction STRICTEMENT croissante ou décroissante :**


Si la dérivée  $f'$  est **strictement positive** sur  $I$ , sauf peut-être en un nombre fini de réels où elle s'annule, alors  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$ .

Si la dérivée  $f'$  est **strictement négative** sur  $I$ , sauf peut-être en un nombre fini de réels où elle s'annule, alors  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$ .

**Extremum :**

-  $f$  admet **un minimum** sur  $I$  en  $x_m$ , si pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f(x_m) \leq f(x)$

-  $f$  admet **un maximum** sur  $I$  en  $x_M$ , si pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f(x_M) \geq f(x)$



**Lien avec la dérivation :**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle **ouvert**  $I$  (attention donc aux extrémités) et  $c$  un réel de  $I$ .

Si  $f$  admet un extremum local en  $c$ , alors  $f'(c) = 0$ .

**Et réciproquement :**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle ouvert  $I$  et  $c$  un réel de  $I$ .

Si la dérivée  $f'$  s'annule en  $c$  en **changeant de signe**, alors  $f(c)$  est un extremum local de  $f$  sur  $I$ .

**Pour fixer les idées :**

On choisit les extrema éventuels de  $f$  parmi les réels  $c$  vérifiant :

- $c$  est une borne de  $I$ ,
- $c$  est un réel où  $f$  n'est pas dérivable,
- $c$  est un réel où  $f$  est dérivable et tel que  $f'(c) = 0$