

Chapitre 9 - VARIABLES ALÉATOIRES DISCRÈTES

1) DÉFINITION

Définition :

Soit Ω l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire.

- On appelle **variable aléatoire** toute fonction X de Ω dans \mathbb{R} qui, à tout élément de Ω , fait correspondre un nombre réel x .
- L'événement de Ω , noté $\{X = x\}$, est l'ensemble des éléments de Ω qui ont pour image x par X .
- $X(\Omega)$, l'ensemble image de Ω par X est l'ensemble de toutes les images des éléments de Ω par X . Cet ensemble est noté Ω' .

Une variable aléatoire n'est pas un nombre, mais une fonction.
Les valeurs d'une variable aléatoire sont toujours des nombres.

En général, une variable aléatoire est notée $X, Y, Z \dots$

Exemple : Pour tout le chapitre

On lance un dé non truqué à six faces numérotées de 1 à 6 et on note le nombre figurant sur la face supérieure du dé. L'univers de cette expérience aléatoire est : $\Omega =$

On peut, par exemple, définir une variable aléatoire X de la façon suivante :

- $X = 0$ si le nombre est pair
- $X = 1$ si le nombre est impair

L'ensemble image de Ω par X est $X(\Omega) = \Omega' =$

On a $\{X=0\} =$ et $\{X=1\} =$

Remarque : On note $\{X \geq a\}$, l'événement « la variable aléatoire X prend une valeur supérieure ou égale à a », c'est à dire l'ensemble des éléments de Ω qui ont une image supérieure ou égale à a par X . On définit de même $\{X \leq a\}$, $\{X > a\}$ et $\{X < a\}$.

2) LOI DE PROBABILITÉ D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE (on dit aussi loi image de la variable aléatoire)

Définition :

Soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ un ensemble sur lequel a été définie une loi de probabilité.

$\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ est l'ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire X .

La loi de probabilité de X est la fonction définie sur Ω' , qui à chaque x_i fait correspondre le nombre $p_i' = P(X = x_i)$

On démontre facilement que

$$\sum_{i=1}^m P(X = x_i) = 1$$

Exemple :

La loi de probabilité de la variable aléatoire définie ci-dessus est :

x_i		
$p_i' = P(X = x_i)$		

3) ESPÉRANCE, VARIANCE, ÉCART TYPE

Si les issues d'une expérience aléatoire sont des nombres réels, on peut définir les nombres ci-dessous :

Définition :

Soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ un ensemble sur lequel a été définie une loi de probabilité. On note p_i la probabilité de l'éventualité ω_i .

- **L'espérance mathématique** de la loi de probabilité est le nombre μ défini par : $\mu = \sum_{i=1}^n p_i \omega_i$
- **La variance** de la loi de probabilité est le nombre V défini par : $V = \sum_{i=1}^n p_i (\omega_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n p_i \omega_i^2 - \mu^2$
- **L'écart type** de la loi de probabilité est le nombre σ défini par : $\sigma = \sqrt{V}$

Preuve : formule de la variance

Définition :

L'espérance mathématique, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire X sont respectivement l'espérance mathématique, la variance et l'écart type de la loi de probabilité de X définie sur Ω' .

Les notations respectives sont $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

$$E(X) = \sum_{i=1}^m P(X=x_i) x_i$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^m P(X=x_i) x_i^2 - E(X)^2$$

Exemple :

$$E(X) = \quad V(X) = \quad \text{et } \sigma(X) =$$

Remarques :

- On peut interpréter l'espérance comme étant la valeur moyenne dans le cas d'un grand nombre de répétitions ou encore comme étant la valeur que l'on peut espérer obtenir.
- Si la variable aléatoire X désigne le gain d'un jeu, on dit que ce jeu est équitable lorsque $E(X)=0$.
- Comme en statistique descriptive, l'écart type mesure la dispersion. Plus l'écart type est faible, plus les valeurs tendent à être regroupées autour de l'espérance.

Propriété :

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$. On a :

$$E(aX+b) = aE(X)+b \quad V(aX+b) = a^2 V(X)$$

Preuve :

Soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ un ensemble sur lequel a été définie une loi de probabilité.

$\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ est l'ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire X .

On a alors $E(X) = \sum_{i=1}^n p_i' x_i$ et $V(X) = \sum_{i=1}^n p_i' x_i^2 - E(X)^2$

• $E(aX+b) = \sum_{i=1}^n p_i' (ax_i + b) = \sum_{i=1}^n (a p_i' x_i + b p_i') = \sum_{i=1}^n a p_i' x_i + \sum_{i=1}^n b p_i' = a \sum_{i=1}^n p_i' x_i + b \sum_{i=1}^n p_i'$

Or $E(X) = \sum_{i=1}^n p_i' x_i$ et $\sum_{i=1}^n p_i' = 1$. On en déduit que $E(aX+b) = aE(X)+b$

• $V(aX+b) = \sum_{i=1}^n p_i' (ax_i + b)^2 - E(aX+b)^2$
 $= \sum_{i=1}^n p_i' \times (a^2 x_i^2 + 2abx_i + b^2) - (aE(X)+b)^2$
 $= \sum_{i=1}^n (p_i' a^2 x_i^2 + p_i' 2 abx_i + p_i' b^2) - (a^2 E(X)^2 + 2ab E(X) + b^2)$
 $= a^2 \sum_{i=1}^n p_i' x_i^2 + 2ab \sum_{i=1}^n p_i' x_i + b^2 \sum_{i=1}^n p_i' - a^2 E(X)^2 - 2ab E(X) - b^2$

Or $2ab \sum_{i=1}^n p_i' x_i = 2ab E(X)$ et $b^2 \sum_{i=1}^n p_i' = b^2 \times 1 = b^2$. Ainsi $V(aX+b) = a^2 \left(\sum_{i=1}^n p_i' x_i^2 - E(X)^2 \right) + 2ab E(X) + b^2 - 2ab E(X) - b^2 = a^2 V(X)$

Remarque :

Dans toutes les situations étudiées jusqu'à présent, la variable aléatoire X prend un nombre fini de valeurs. On dit que X est **discrète**.