

# CALCUL NUMÉRIQUE

## 1) ENSEMBLE DES NOMBRES

### A) DÉFINITIONS ET NOTATIONS

- $\mathbb{N}$  est l'ensemble des **nombres entiers naturels** .  $\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$
- $\mathbb{Z}$  est l'ensemble des **nombres entiers relatifs** (ou **nombres entiers**)  $\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$
- $\mathbb{D}$  est l'ensemble des **nombres décimaux** . ( nombres s'écrivant  $n \times 10^p$  avec  $n$  et  $p$  dans  $\mathbb{Z}$  )

Exemple :  $26 \times 10^{-2} = 0,26$  ;  $-7 \times 10^4 = -70000$

- $\mathbb{Q}$  est l'ensemble des **nombres rationnels** . ( nombres que l'on peut écrire sous la forme  $\frac{p}{q}$  ,  $p$  étant un nombre entier et  $q$  un entier non nul )

Exemple :  $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, -\frac{5}{7}$

- On appelle **nombre irrationnel** tout nombre que l'on ne peut pas écrire sous la forme  $\frac{p}{q}$  ,  $p$  étant un nombre entier et  $q$  un entier non nul

Exemple :  $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \pi$

- $\mathbb{R}$  est l'ensemble des **nombres réels** , c'est à dire qui sont soit rationnels, soit irrationnels.

### B) SYMBOLES D'INCLUSION

Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles :

$A \subset B$  se lit : "  $A$  est **inclus** dans  $B$  " , "  $A$  est **contenu** dans  $B$  " ou "  $A$  est **une partie** de  $B$  "

$A \subset B$  signifie que tout élément de l'ensemble  $A$  appartient à l'ensemble  $B$ .

Si  $A$  n'est pas inclus dans  $B$  on note :  $A \not\subset B$

Exemple :  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{Z}$  car par exemple  $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$  et  $\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$

## 2) RAPPELS

### A) PRODUITS Soit $a, b, c$ et $d$ des réels :

<b>RÈGLE DES SIGNES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>a \times (-b) = (-a) \times b = -ab</math></li><li>• <math>(-a) \times (-b) = ab</math></li></ul>
<b>PRODUIT NUL</b>	Dire qu'un produit est nul signifie que l'un des facteurs au moins est nul
<b>SIMPLIFICATION</b>	$ac = bc$ et $c \neq 0 \Rightarrow a = b$
<b>DISTRIBUTIVITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>c(a + b) = ca + cb</math></li><li>• <math>(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd</math></li></ul>
<b>PRODUITS REMARQUABLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2</math></li><li>• <math>(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2</math></li><li>• <math>(a + b)(a - b) = a^2 - b^2</math></li></ul> <p><u>Exemple :</u> 1) Développer et réduire</p> <p>a) <math>(x - 2y)^2 = x^2 - 4xy + 4y^2</math></p> <p>b) <math>(2x + y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2</math></p> <p>c) <math>(a - b)^2 + (2a - 5b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 + 4a^2 - 20ab + 25b^2 = 5a^2 - 22ab + 26b^2</math></p> <p>d) <math>(3x - 4y)(3x + 4y) = 9x^2 - 16y^2</math></p> <p>e) <math>(\sqrt{2} - \sqrt{7}x)(\sqrt{2} + \sqrt{7}x) = 2 - 7x^2</math></p>

	<p>2 ) Factoriser</p> <p>a ) <math>x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2</math></p> <p>b ) <math>4y^2 - 12y + 9 = (2y - 3)^2</math></p> <p>c ) <math>16a^2 - 80a + 100 = (4a - 10)^2</math></p> <p>d ) <math>5x^2 - 7y^2 = (\sqrt{5}x - \sqrt{7}y)(\sqrt{5}x + \sqrt{7}y)</math></p> <p>e ) <math>(x - y)^2 - (2x - 4y)^2 =</math>  <math>((x - y) - (2x - 4y))((x - y) + (2x - 4y)) = (x - y - 2x + 4y)(x - y + 2x - 4y) = (-x + 3y)(3x - 5y)</math></p>
--	--

**B ) QUOTIENTS** Soit  $a, b, c$  et  $d$  des réels avec  $c$  et  $d$  non nuls :

<b>GÉNÉRALITÉS</b>	$\frac{a}{1} = a$ ; $\frac{0}{c} = 0$ ; $\frac{a}{0}$ est impossible
<b>RÈGLE DES SIGNES</b>	$\frac{-a}{c} = \frac{a}{-c} = -\frac{a}{c}$ ; $\frac{-a}{-c} = \frac{a}{c}$
<b>SIMPLIFICATION</b>	$\frac{ad}{cd} = \frac{a}{c}$ <b>Attention :</b> $\frac{a+d}{c+d} \neq \frac{a}{c}$
<b>ÉGALITÉ</b>	$\frac{a}{c} = 0 \Leftrightarrow a = 0$ ; $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \Leftrightarrow ad = bc$
<b>ADDITION</b>	$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$ ; $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{ad+bc}{cd}$
<b>MULTIPLICATION</b>	$\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{ab}{cd}$
<b>DIVISION</b>	$\frac{1}{\frac{c}{d}} = \frac{d}{c}$ ; $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$ (avec $b \neq 0$ )   ; $\frac{\frac{a}{c}}{\frac{d}{c}} = \frac{ad}{c^2}$ ; $\frac{\frac{a}{c}}{\frac{d}{d}} = \frac{a}{cd}$

**Exemple :**  
Écrire sous forme irréductible le nombre suivant :

$$A = \frac{\frac{4}{5} + \frac{2}{3}}{\frac{1}{3} - \frac{4}{7}} = \frac{\frac{12}{15} + \frac{10}{15}}{\frac{7}{21} - \frac{12}{21}} = \frac{\frac{22}{15}}{-\frac{5}{21}} = -\left(\frac{22}{15}\right) \times \left(\frac{21}{5}\right) = -\frac{22 \times 3 \times 7}{5 \times 3 \times 5} = -\frac{154}{25}$$

**C ) PUISSANCES** Soit  $a$  et  $b$  des réels et  $p$  et  $q$  des entiers :

<b>DÉFINITION</b>	$a^0 = 1$ ; $a^p = a \times a \times \dots \times a$ ( $p$ facteurs , $p \geq 1$ ) ; $a^1 = a$ $a^{-p} = \frac{1}{a^p}$ ; $a^{-1} = \frac{1}{a}$ ( $a \neq 0$ )
<b>SIGNE</b>	Pour $p$ pair $(-a)^p = a^p$ et pour $p$ impair $(-a)^p = -a^p$
<b>RÈGLES DE CALCUL</b>	Pour $a$ et $b$ non nuls : $a^p \times a^q = a^{p+q}$ ; $\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$ ; $(a^p)^q = a^{pq} = (a^q)^p$ $(ab)^p = a^p \times b^p$ ; $\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$

<b>NOTATION SCIENTIFIQUE</b>	<p>La notation scientifique d'un nombre décimal est de la forme <math>a \times 10^p</math> où <math>a</math> est un nombre décimal ayant un seul chiffre non nul avant la virgule et <math>p</math> est un entier.</p> <p><b>Exemple :</b> Écrire les nombres ci-dessous sous forme scientifique :</p> $A=0,0452 = 4,52 \times 10^{-2} \quad ; \quad B=12478 = 1,2478 \times 10^4$ $C = \frac{(-7)^3 \times (-10)^{-8})^5}{(-7^2 \times 10^4)^7} = \frac{(-7^3 \times 10^{-8})^5}{(-7^2 \times 10^4)^7} = \frac{(7^3 \times 10^{-8})^5}{(7^2 \times 10^4)^7} = \frac{7^{15} \times 10^{-40}}{7^{14} \times 10^{28}} = 7 \times 10^{-68}$
------------------------------	--

## D.) RACINES CARRÉES

<b>DÉFINITION</b>	<p>Lorsque <math>a</math> est un nombre positif, <math>\sqrt{a}</math> désigne l'unique nombre positif dont le carré est égal à <math>a</math>.</p> <p><b>Attention:</b> un nombre négatif n'a pas de racine carrée.</p>
<b>RÈGLES DE CALCUL</b>	<p>Pour <math>a</math> et <math>b</math> positif :</p> $\sqrt{a^2} = (\sqrt{a})^2 = a \quad ; \quad \sqrt{a^p} = (\sqrt{a})^p \quad (p \text{ entier naturel})$ $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad ; \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b \neq 0)$ <p><b>Exemple :</b></p> <p>1) Écrire les nombres ci-dessous sous la forme <math>a\sqrt{b}</math> où <math>b</math> est le plus petit entier possible.</p> <p>a) <math>\sqrt{32} = 4\sqrt{2}</math>      b) <math>\sqrt{72} = 6\sqrt{2}</math>      c) <math>\sqrt{500} = 10\sqrt{5}</math>      d) <math>\sqrt{147} = 7\sqrt{3}</math></p> <p>2) Écrire les nombres ci-dessous sans racine carrée au dénominateur :</p> <p>a) <math>\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}</math>      b) <math>\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{11}} = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{11}}{\sqrt{11} \times \sqrt{11}} = \frac{\sqrt{77}}{11}</math></p> <p>c) <math>\frac{3}{5-\sqrt{3}} = \frac{3 \times (5+\sqrt{3})}{(5-\sqrt{3})(5+\sqrt{3})} = \frac{15+3\sqrt{3}}{25-3} = \frac{15+3\sqrt{3}}{22}</math>      d) <math>\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} \times (\sqrt{2}+\sqrt{3})}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})\sqrt{2}+\sqrt{3}} = \frac{2+\sqrt{6}}{2-3} = -2-\sqrt{6}</math></p>
<b>MISE EN GARDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il n'existe pas de relation simple entre <math>\sqrt{a+b}</math> et <math>\sqrt{a} + \sqrt{b}</math></li> <li>• Si <math>a &lt; 0</math> alors <math>\sqrt{a^2} = -a</math></li> </ul>
<b>ÉQUATION <math>x^2=a</math></b>	<p>Soit <math>a</math> un réel, l'équation <math>x^2=a</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n'admet pas de solution si <math>a &lt; 0</math></li> <li>• admet une unique solution 0 si <math>a=0</math></li> <li>• admet deux solutions <math>\sqrt{a}</math> et <math>-\sqrt{a}</math> si <math>a &gt; 0</math></li> </ul> <p><b>Exemple :</b></p> <p>1) Résoudre les équations ci-dessous :</p> <p>a) <math>x^2=5 \Leftrightarrow x=-\sqrt{5}</math> ou <math>x=\sqrt{5}</math></p> <p>b) <math>t^2=3-\pi</math>      <math>3-\pi &lt; 0</math>, donc il n'y a pas de solution.</p> <p>c) <math>(x-2)^2=8 \Leftrightarrow x-2=-\sqrt{8}</math> ou <math>x-2=\sqrt{8} \Leftrightarrow x=2-2\sqrt{2}</math> ou <math>x=2+2\sqrt{2}</math></p> <p>d) <math>3x^2=7 \Leftrightarrow (\sqrt{3}x)^2=7 \Leftrightarrow \sqrt{3}x=-\sqrt{7}</math> ou <math>\sqrt{3}x=\sqrt{7} \Leftrightarrow x=-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}}</math> ou <math>x=\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}}</math>  <math>\Leftrightarrow x=-\sqrt{\frac{7}{3}}</math> ou <math>x=\sqrt{\frac{7}{3}}</math></p>