

## CONDITIONNEMENT – INDÉPENDANCE

### **1) PROBABILITÉS CONDITIONNELLES**

#### **Définition :**

Soit  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $P(B) \neq 0$ .

On appelle « **probabilité conditionnelle de  $A$  par rapport à  $B$**  » ou « **probabilité de  $A$  sachant  $B$**  » le réel, noté  $P_B(A)$  (parfois noté  $P(A|B)$ ) défini par :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

#### **Exemple :**

Un lycée a présenté 356 candidats au bac, dont 96 en série S. 256 élèves ont été admis à l'examen ; parmi eux 64 provenaient de la série S. Un élève étant choisi au hasard parmi les candidats présentés par le lycée, on note  $A$  l'événement : « l'élève provient de la série S » et  $B$  l'événement : « l'élève a été reçu au bac ».

Chaque élève a la même chance d'être choisi ; par équiprobabilité, on a donc :

$$P(A) = \frac{96}{356}, \quad P(B) = \frac{256}{356} \quad \text{et} \quad P(A \cap B) = \frac{64}{356}$$

$$\text{On en déduit que } P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{64}{256} = \frac{1}{4} = 0,25$$

La probabilité que l'élève provienne de la série S **sachant qu'il est reçu au bac**, est donc égale à 0,25 .

En général :  
 $P_B(A) \neq P_A(B)$

$$\text{On a aussi } P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{64}{96} = \frac{2}{3}$$

Ainsi la probabilité que l'élève soit reçu au bac **sachant qu'il provient de la série S** est  $\frac{2}{3}$  .

#### **Remarques :**

- Si  $A \subset B$ , alors  $A \cap B = A$  et  $P_B(A) = \frac{P(A)}{P(B)}$
- Si  $B \subset A$ , alors  $A \cap B = B$  et  $P_B(A) = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

#### **Propriétés :**

Soit  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $P(B) \neq 0$  . On a :

$$0 \leq P_B(A) \leq 1 \quad \text{et} \quad P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A)$$

**Preuve :** La preuve du deuxième point est nécessaire pour la dernière démonstration du cours.


- On a  $A \cap B \subset B$ , donc  $0 \leq P(A \cap B) \leq P(B)$  et en divisant les trois membres de cette inégalité par le nombre strictement positif  $P(B)$ , on obtient :  $0 \leq \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq P_B(A) \leq 1$

- On a  $P_B(A \cup \bar{A}) = \frac{P((A \cup \bar{A}) \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B))}{P(B)}$

Or  $P_B(A \cup \bar{A}) = P_B(\Omega) = 1$  et les événements  $(A \cap B)$  et  $(\bar{A} \cap B)$  sont incompatibles.

Ce qui donne :

$$1 = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow 1 = P_B(A) + P_B(\bar{A}) \Leftrightarrow P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A)$$



On voit que :  $(A \cup \bar{A}) \cap B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$

### **2) PROBABILITÉ D'UNE INTERSECTION**

#### **Propriété :** Formule des probabilités composées

Soit  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $P(B) \neq 0$  et  $P(A) \neq 0$  . On a :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) \quad \text{et} \quad P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$$

Ces égalités se déduisent de la définition précédente.

Ces deux égalités se retiennent assez facilement : pour que l'événement  $A$  et  $B$  soit réalisé, il faut d'abord que l'événement  $A$  le soit, et sachant que l'événement  $A$  est réalisé, il faut ensuite que l'événement  $B$  le soit aussi ...

#### **Exemple :**

Une urne contient trois boules bleues et cinq rouges, indiscernables au toucher.

On tire au hasard une première boule de l'urne . Si elle est bleue, on la remet dans l'urne et on rajoute une autre boule bleue ; si elle est rouge, on ne la remet pas dans l'urne . On tire ensuite, au hasard, une seconde boule de l'urne.

On s'intéresse à la probabilité pour que les deux boules extraites soient bleues.

$B_1$  est l'événement : « la première boule extraite est bleue » ;  $B_2$  est l'événement : « la seconde boule extraite est bleue ».

L'événement « les deux boules extraites sont bleues » est alors  $B_1 \cap B_2$  .

On a  $P(B_1 \cap B_2) = P(B_1) \times P_{B_1}(B_2)$

Les boules ont la même chance d'être tirées ; par équiprobabilité, on a donc :  $P(B_1) = \frac{3}{8}$

$B_1$  étant réalisé, on rajoute une boule bleue, si bien qu'au moment du second tirage il y a 4 boules bleues sur 9 boules dans l'urne.

Ce qui permet d'écrire  $P_{B_1}(B_2) = \frac{4}{9}$

On en déduit :  $P(B_1 \cap B_2) = \frac{3}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{1}{6}$ . La probabilité que les deux boules extraites soient bleues est donc égale à  $\frac{1}{6}$


### 3) FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES

$\Omega$  est l'univers des événements élémentaires d'une expérience aléatoire.  $A_1, A_2, \dots, A_n$  désignent des événements de  $\Omega$ .

#### Définition :

Dire que  $A_1, A_2, \dots, A_n$  réalisent **une partition** de l'univers  $\Omega$ , signifie que :

- les événements  $A_1, A_2, \dots, A_n$  sont deux à deux disjoints
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$



Tout événement  $B$  est alors la réunion **disjinte** des événements  $A_1 \cap B, A_2 \cap B, \dots, A_n \cap B$

On a donc  $P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$

De plus pour tout  $i$  tel que  $1 \leq i \leq n$ , on a  $P(A_i \cap B) = P(A_i) \times P_{A_i}(B)$

#### Propriété : Formule des probabilités totales

Dans les conditions précédentes on a :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$

La deuxième formule permet de calculer la probabilité d'un événement  $B$  dans le cas (fréquent) où l'on connaît les probabilités  $P(A_i)$  d'une famille d'événements  $A_i$  constituant une partition de l'univers  $\Omega$ , ainsi que les probabilités conditionnelles de l'événement  $B$  par rapport à chaque événement  $A_i$ .

#### Exemple :

Un test d'une maladie est effectué sur la totalité d'une population.

Une étude statistique établit que 70 % de la population réagit négativement au test (événement  $N$ ), 20 % réagit faiblement au test (événement  $F$ ) et 10 % réagit fortement au test (événement  $R$ ).

La probabilité pour une personne de cette population d'être atteinte de la maladie (événement  $M$ ) est :

- 0,9 lorsque le test est fortement positif
- 0,6 lorsque le test est faiblement positif
- 0,05 lorsque le test est négatif

Par hypothèse, on a donc :


$$P(R) = 0,1, P(F) = 0,2, P(N) = 0,7, P_R(M) = 0,9, P_F(M) = 0,6 \text{ et } P_N(M) = 0,05$$

Les événements  $R, F$  et  $N$  constituent une partition de la population.

D'après la formule des probabilités totales, on en déduit que :

$$P(M) = P(R) \times P_R(M) + P(F) \times P_F(M) + P(N) \times P_N(M) = 0,1 \times 0,9 + 0,2 \times 0,6 + 0,7 \times 0,05 = 0,245$$


La probabilité pour qu'une personne de cette population soit atteinte de la maladie est donc égale à 0,245



### 4) RÈGLES DE CONSTRUCTION D'UN ARBRE PONDÉRÉ (ou arbre de probabilités)

Pour déterminer des probabilités, on peut être amené à construire des arbres dont les branches sont affectées de probabilités.

- Un arbre pondéré se construit et se lit de gauche à droite.
- L'origine de l'arbre est la **racine** de l'arbre.
- Les traits partant de la racine sont appelés **branches primaires** de l'arbre. Elles mènent à des **nœuds**.
- Les branches joignant deux nœuds sont dites **secondaires**.
- Tout chemin menant de la racine à un nœud est appelé **trajet**.





### Remarques :

- Tout évènement  $A$  est indépendant de l'évènement certain et de l'évènement impossible.
- Ne pas confondre événements **incompatibles** et événements **indépendants**.

Deux événements  $A$  et  $B$  sont incompatibles si et seulement si  $A \cap B = \emptyset$ . On a alors :  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Dans l'exemple précédent, les événements  $B$  et  $U$  sont indépendants, mais non incompatibles ; les événements  $B$  et  $Q$  sont incompatibles et non indépendants.

### Propriété :

Soit  $A$  et  $B$  deux événements de probabilités non nulles.

Si  $A$  et  $B$  sont deux événements indépendants, alors il en est de même pour  $\bar{A}$  et  $B$ .

### Preuve : *exigible*

$$\text{On a : } P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)}$$

Or  $A$  et  $B$  sont deux événements indépendants.

$$\text{On en déduit que : } P_B(\bar{A}) = \frac{P(B) - P(A) \times P(B)}{P(B)} = \frac{P(B) \times (1 - P(A))}{P(B)} = 1 - P(A) = P(\bar{A})$$