

## LES NOMBRES COMPLEXES : UTILISATION

### 1) INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE DE $\frac{c-a}{b-a}$

On se place dans le plan rapporté à un repère orthonormal direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

#### Propriétés :

Soit A, B et C quatre points distincts d'affixes respectives  $a$ ,  $b$  et  $c$ . On a :

- $\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = \frac{AC}{AB}$
- $\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) [2\pi]$

#### Preuve :

- On a bien  $a \neq b$  car les points sont distincts. On a alors :

$$\left| \frac{c-a}{b-a} \right| =$$

- La preuve de la deuxième propriété nécessite de connaître quelques propriétés des angles orientés de vecteurs qui sont faciles à mettre en place en faisant un schéma.

Soit  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  trois vecteurs non nuls du plan orienté. On a :

- Relation de Chasles :  $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) [2\pi]$
- $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u}) [2\pi]$

$$\begin{aligned} \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) &= \arg(c-a) - \arg(b-a) = (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AC}) - (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AB}) [2\pi] \\ &= -(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AC}) [2\pi] \\ &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{u}) + (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AC}) [2\pi] \\ &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) [2\pi] \quad (\text{D'après la relation de Chasles}) \end{aligned}$$

#### Remarques :

Soit A, B, C et D quatre points distincts d'affixes respectives  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$ . On a :

- A appartient à la médiatrice de [BC] si et seulement si
- Les points A, B et C sont alignés si et seulement si
- Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires si et seulement si

### 2) RACINES $n$ -ièmes DE L'UNITÉ

On se place dans le plan rapporté à un repère orthonormal direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

#### Définition :

Soit  $n$  un entier naturel non nul.

On appelle racine  $n$ -ième de l'unité, tout nombre complexe  $z$  vérifiant  $z^n = 1$ .

1 est bien sûr toujours une racine  $n$ -ième de l'unité

#### Remarque :

Les racines  $n$ -ième de l'unité sont les racines du polynôme  $P(z) = z^n - 1$

#### Propriété et définition :

Soit  $n$  un entier naturel non nul.

L'équation  $z^n = 1$  admet exactement  $n$  racines  $n$ -ièmes de l'unité distinctes.

Il s'agit des nombres complexes  $e^{\frac{i2k\pi}{n}}$  où  $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$

On note  $U_n$  l'ensemble des racines  $n$ -ièmes de l'unité

### **Preuve :**

Soit  $n$  un entier naturel non nul et un complexe  $z = r e^{i\theta}$  où  $r \in \mathbb{R}_+^*$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ . On a :

$$z^n = 1 \Leftrightarrow$$

Ainsi tous les nombres complexes  $e^{\frac{i2k\pi}{n}}$  où  $k \in \mathbb{Z}$  sont solutions de l'équation  $z^n = 1$ .

En particulier les nombres complexes  $e^{\frac{i2k\pi}{n}}$  où  $k \in [0, 1, 2, \dots, n-1]$  sont bien sûr solutions.

Soit  $K$  un entier quelconque.

En effectuant la division euclidienne de  $K$  par  $n$ , on obtient.

On retrouve donc une solution de la forme  $e^{\frac{i2k\pi}{n}}$  où  $k \in [0, 1, 2, \dots, n-1]$  et on en déduit le résultat attendu.

### **Propriété :**

Soit  $n$  un entier naturel non nul.

Les points images des éléments de  $U_n$  appartiennent au cercle trigonométrique.

Ce qui est trivial, car ils ont pour module 1.

Pour  $n \geq 3$ , les points images des éléments de  $U_n$  sont les sommets d'un polygone régulier à  $n$  sommets.

### **Quelques cas particuliers :**

- Les racines 2-ièmes (ou racines carrées) de l'unité sont les nombres complexes tels que  $z^2 = 1$ .

Dans ce cas on trouve facilement  $-1$  et  $1$ . On a


- Les racines 3-ièmes de l'unité sont les nombres complexes tels que  $z^3 = 1$ .

Les solutions sont les nombres complexes :

On note :


$$j = e^{\frac{i2\pi}{3}}. \text{ On a alors } \bar{j} = e^{\frac{i4\pi}{3}}. \text{ Ainsi}$$

Les points images des éléments de  $U_3$  sont les sommets du triangle équilatéral ABC.



- Les racines 4-ièmes de l'unité sont les nombres complexes tels que  $z^4 = 1$ .

Dans ce cas on peut factoriser facilement pour déterminer les racines de l'unité :



Les points images des éléments de  $U_4$  sont les sommets du carré ABCD.